

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4452-301

- Aktualisierung 2015

Gebiet

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Gebietsnummer: | 4452-301 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | 099 | Biogeographische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen | | |
| Name: | Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg | | |
| geographische Länge (Dezimalgrad): | 14,4764 | geographische Breite (Dezimalgrad): | 51,4711 |
| Fläche: | 820,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | Juni 2002 | Als GGB bestätigt: | Dezember 2004 |
| Ausweisung als BEG: | April 2011 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | VO der LD Dresden zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg' vom 14.01.2011 (SächsABLSDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 650), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | Bruns | | |
| Erfassungsdatum: | März 2002 | Aktualisierung: | Mai 2012 |
| meldende Institution: | Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|----------------|
| MTB | 4452 | Spremberg |
| MTB | 4552 | Weißkollm |
| MTB | 4553 | Weißwasser Süd |
| MTB | 4652 | Lohsa |
| MTB | 4653 | Klitten |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|---------|
| DED2 | Dresden |
| DED2 | Dresden |

Naturräume:

| | |
|-----|---------------------------|
| 842 | Lausitzer Grenzwall |
| 844 | Niederlausitzer Randhügel |
| | |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 890 | Oberlausitzer Teichgebiet |
| 891 | Muskauer Heide |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D13 | Oberlausitzer Heideland |

Bewertung, Schutz:

| | |
|------------------------------|--|
| Kurzcharakteristik: | Flussaue der Spree in Nachbarschaft zur Bergbaufolgelandschaft mit naturnahen Fließstrecken, Altarmen, Auwaldresten und Auewiesen, dazu Sandflächen, teilweise Binnendünen, mit Silbergrasfluren und trockenen Heidebeständen |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Naturnaher Flußlauf als Lebensraum mehrerer gefährdeter Tierarten (u.a. Steinbeißer, Grüne Keiljungfer, Fischotter), naturraumtypische, großflächige Heidebestände mit Wacholder und offene Sandrasen, Magerrasen, Kohärenzaspekte, Vork. Wolf |
| Kulturhistorische Bedeutung: | |
| geowissensch. Bedeutung: | |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|-----|--|------|
| D | Binnengewässer | 8 % |
| E | Fels- und Rohbodenkomplexe | 13 % |
| F1 | Ackerkomplex | 1 % |
| G | Grünlandkomplexe trockener Standorte | 11 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 14 % |
| I1 | Niedermoorkomplex (auf organischen Böden) | 0 % |
| I2 | Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden | 0 % |
| J2 | Ried- und Röhrichtkomplex | 0 % |
| K | Zwergstrauchheidenkomplexe | 13 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 6 % |
| L04 | Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten' | 0 % |
| N | Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil) | 5 % |
| N04 | Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 7 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 4 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 4 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 14 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|---|-----------|----------|
| 4452-301 | 4450-451 | 44 | EGV | b | * | Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda | 5.075,00 | 18 |
| 4452-301 | 4552-451 | 46 | EGV | b | * | Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft | 30.059,00 | 4 |
| 4452-301 | 4552-452 | 47 | EGV | b | * | Muskauer und Neustädter Heide | 14.055,00 | 13 |

Legende

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|----------------|
| Gewässerausbau |
|----------------|

Einflüsse und Nutzungen:

| Code | Auswirkung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|-----------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| A01 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |
| A01 | positiv | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |
| A02 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| B | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| B02.01 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| D01.02 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| D02.01 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| G01.01 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| H01 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| I01 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| J02.05 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| J02.05.02 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| J02.10 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| K02 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| K04.05 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |

Management:**Institute**

| |
|---|
| AfG - BR, AfG - BR |
| Landesdirektion Sachsen, Landesdirektion Sachsen |
| UNB Bautzen, UNB Bautzen |
| UNB Görlitz, UNB Görlitz |

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|--|---|
| Managementplan für das SAC 099 'Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg' (bearbeitet durch Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR), 2010 | http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|---|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 2310 | Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] | 3,13 | | | G | C | | 1 | 1 | B | | C | C | 2009 |
| 2330 | Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland] | 13,69 | | | G | C | | 2 | 1 | B | | B | B | 2009 |
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | 0,33 | | | G | C | | 1 | 1 | C | | C | C | 2009 |
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | 0,49 | | | G | C | | 1 | 1 | B | | C | C | 2009 |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion | 5,29 | | | G | A | | 1 | 1 | B | | B | C | 2009 |
| 4030 | Trockene europäische Heiden | 68,27 | | | G | A | | 2 | 1 | B | | B | B | 2009 |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | 0,05 | | | G | C | | 1 | 1 | B | | C | C | 2009 |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 42,06 | | | G | B | | 1 | 1 | B | | B | C | 2009 |
| 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur | 0,89 | | | G | B | | 1 | 1 | B | | B | B | 2009 |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 4,62 | | | G | B | | 1 | 1 | B | | B | C | 2009 |
| 91F0 | Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris) | 6,03 | | | G | B | | 1 | 1 | B | | B | C | 2009 |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|------------------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| FISH | Cobitis taenia | | | r | kD | 1 | | 3 | 1 | h | B | | A | C | II | 2009 |
| FISH | Lampetra planeri | | | n | kD | 1 | | 1 | 1 | h | B | | B | C | II | 2009 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|--|---|----|-------|---|---|---|---|--|---|---|----|------|
| LEP | Lycaena dispar | | | n | kD | 1 | 4 | 1 | d | A | | A | B | II | 2009 |
| MAM | Barbastella barbastellus | | | g | kD | 1 | 1 | 1 | h | B | | B | C | II | 2009 |
| MAM | Canis lupus | | | n | kD | 1 | 3 | 1 | w | B | | A | A | II | 2009 |
| MAM | Lutra lutra | | | n | kD | 1 | 2 | 1 | h | B | | A | B | II | 2009 |
| MAM | Lutra lutra | | | e | M | 0 - 1 | 1 | 1 | h | B | | B | C | II | 2009 |
| MAM | Myotis myotis | | | g | kD | 1 | 1 | 1 | h | B | | B | C | II | 2009 |
| ODON | Ophiogomphus cecilia | | | r | kD | 1 | 1 | 1 | h | B | | B | C | II | 2009 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |

Legende

| Grund | Status |
|--|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|---|------|--|-------------|-----|--------|--------|
| SN63446340204076 | Freistaat Sachsen | 2010 | Managementplan für das SCI 099 'Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg' (bearbeitet durch Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR) | | | | |
| SN63472872599206 | Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) | 2011 | Zentrale Artdatenbank (Multibase CS) | | | | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |