

Berichtspflichten nach Artikel 17 FFH-Richtlinie 2001-2006: Erhaltungszustand der Lebensraumtypen im Freistaat Sachsen mit Flächenschätzungen und Bewertungen

Datenstand: 15.04.2008

Fassung: 01.03.2011

FFH-Lebensraumtyp		Sachsen	kontinentale Region Deutschlands (1)		Erhaltungszustand Sachsen				Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands (1)	
					Einzelparameter		Gesamtbewertung			
Code	Kurzbezeichnung	Vorkommen [ha] (Schätzung 12/2006)	Vorkommen [ha]	Anteil Sachsen an Bestand in kont. Region D	Verbreitungsgebiet	aktuelle Fläche	Strukturen und Funktionen	Zukunftsansichten	Gesamtbewertung	Gesamtbewertung
2310	Binnendünen mit Sandheiden	220	3.240	7%	FV	FV	U1	FV	unzureichend	unzureichend
2330	Binnendünen mit offenen Grasflächen	320	7.751	4%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
3130	Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer	500	4.237	12%	FV	XX	FV	XX	unbekannt	unzureichend
3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Stillgewässer	1.050	106.758	1%	FV	FV	FV	XX	günstig	unzureichend
3150	Eutrophe Stillgewässer	7.000	114.198	6%	FV	FV	FV	XX	günstig	unzureichend
3160	Dystrophe Stillgewässer	40	1.270	3%	FV	FV	FV	XX	günstig	schlecht
3260	Fließgewässer mit Unterwasservegetation	1.000	24.714	4%	FV	U1	FV	XX	unzureichend	unzureichend
3270	Flüsse mit Schlammbänken	1.500	12.779	12%	FV	FV	FV	FV	günstig	schlecht
4010	Feuchte Heiden	50	253	20%	FV	FV	FV	U1	unzureichend	unzureichend
4030	Trockene Heiden	3.100	33.538	9%	FV	FV	FV	U1	unzureichend	schlecht
5130	Wacholder-Heiden	0,6	5.518	<1%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
6110	Basophile Pionierrasen	3	607	<1%	FV	FV	FV	XX	günstig	unzureichend
6130	Schwermetallrasen	7	340	2%	FV	XX	FV	U1	unzureichend	unzureichend
6210	Kalk-Trockenrasen	50	35.962	<1%	FV	FV	U2	U1	schlecht	unzureichend
6230	Artenreiche Borstgrasrasen	130	9.731	1%	FV	FV	FV	XX	günstig	unzureichend
6240	Steppen-Trockenrasen	1,5	800	<1%	FV	U2	FV	U1	schlecht	unzureichend
6410	Pfeifengraswiesen	95	10.016	1%	FV	FV	FV	FV	günstig	schlecht
6430	Feuchte Hochstaudenfluren	330	23.387	1%	FV	FV	FV	XX	günstig	günstig
6440	Brenndolden-Auenwiesen	30	4.442	1%	FV	FV	FV	FV	günstig	schlecht
6510	Flachland-Mähwiesen	5.000	146.004	3%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
6520	Berg-Mähwiesen	1.600	20.835	8%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend

FFH-Lebensraumtyp		Sachsen	kontinentale Region Deutschlands ⁽¹⁾		Erhaltungszustand Sachsen				Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands ⁽¹⁾	
Code	Kurzbezeichnung		Vorkommen [ha] (Schätzung 12/2006)	Vorkommen [ha]	Anteil Sachsen an Bestand in kont. Region D	Einzelparameter				Gesamtbewertung
					Verbreitungsgebiet	aktuelle Fläche	Strukturen und Funktionen	Zukunftsansichten	Gesamtbewertung	Gesamtbewertung
7110	Lebende Hochmoore	5,46	4.795	<1%	FV	FV	FV	U1	unzureichend	unzureichend
7120	Regenerierbare Hochmoore	60	12.190	<1%	FV	FV	U2	U2	schlecht	schlecht
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	320	9.096	4%	FV	U1	FV	XX	unzureichend	unzureichend
7150	Torfmoor-Schlenken	18,5	450	4%	FV	XX	FV	XX	unbekannt	unzureichend
7210	Kalkreiche Sümpfe	5,55	1.569	<1%	FV	FV	U2	U2	schlecht	unzureichend
7220	Kalktuff-Quellen	0,02	558	<1%	FV	XX	U2	U1	schlecht	unbekannt
7230	Kalkreiche Niedermoore	3	7.521	<1%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
8150	Silikatschutthalden	50	981	5%	FV	FV	FV	U1	unzureichend	günstig
8160	Kalkhaltige Schutthalden	0,46	743	<1%	FV	FV	FV	FV	günstig	günstig
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	6	1.706	<1%	FV	FV	FV	FV	günstig	günstig
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	1.400	3.446	41%	FV	FV	FV	FV	günstig	günstig
8230	Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation	58	845	7%	FV	FV	FV	XX	günstig	günstig
8310	Höhlen	22 ⁽²⁾	8.000 ⁽³⁾	<1%	FV	FV	FV	FV	günstig	günstig
9110	Hainsimsen-Buchenwälder	11.000	590.216	2%	FV	FV	FV	FV	günstig	günstig
9130	Waldmeister-Buchenwälder	565	660.832	<1%	FV	FV	FV	FV	günstig	günstig
9160	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder	1.400	29.340	5%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder	6.000	66.487	9%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
9180	Schlucht- und Hangmischwälder	1.080	21.096	5%	FV	FV	FV	FV	günstig	günstig
9190	Eichenwälder auf Sandebenen	600	14.555	4%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
91D0	Moorwälder	600	19.814	3%	FV	U1	U2	U1	schlecht	unzureichend
91E0	Erlen- Eschen- und Weichholzauenwälder	2.000	60.282	3%	FV	FV	FV	U1	unzureichend	unzureichend
91F0	Hartholzauenwälder	1.300	13.426	10%	FV	FV	U1	XX	unzureichend	unzureichend
91G0	Pannonische (subkontinentale) Eichen-Hainbuchenwälder	8	74	11%	FV	XX	FV	U1	unzureichend	schlecht
91T0	Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder	2	426	<1%	XX	XX	FV	FV	unbekannt	schlecht
91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe	5	277	2%	FV	FV	FV	FV	günstig	unzureichend
9410	Montane Fichtenwälder	8.900	44.600	20%	FV	FV	FV	FV	günstig	schlecht

(1) Quelle: Nationaler Bericht 2007
[http://www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/natura_2000/doc/40468.php]

(2) Anzahl der Höhlen

(3) Anzahl der Höheneingänge

Gesamtbewertung		Anzahl der LRT	
FV	günstig	27	10
U1	unzureichend	11	27
U2	schlecht	6	9
XX	unbekannt	3	1
Summe		47	47