

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4439-452

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4439-452	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	3	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,3053	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,4819
Fläche:	6.407,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch' vom 27.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 256), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4439	Brehna
MTB	4440	Delitzsch
MTB	4539	Schkeuditz Nord
MTB	4540	Zschortau
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?		nein

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED3	Leipzig
------	---------

Naturräume:

467	Leipziger Land
naturräumliche Haupteinheit:	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Strukturarme Ackerebene mit einzelnen Bächen, Gräben, Gehölzen, Gebüschkomplexen, Reste naturnaher Eichen-Hainbuchen- u. Buchenwälder, halboffene Bergbaufolgelandschaft mit verschiedenen Sukzessionsstadien, Restseen, Tümpeln, Anpflanzungen
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten der schwach strukturierten Agrarlandschaft und der Bergbaufolgelandschaft einschl. Übergangsbereiche, bedeutendes Brut-, Nahrungs- u. Rastgebiet für Wasservogelarten, insbesondere während des Durchzuges
Kulturhistorische Bedeutung:	Teilweise Braunkohle-Bergbaufolgelandschaft mit Restseen, alte Salzstraße quert das Gebiet
geowissensch. Bedeutung:	Bergbaufolgelandschaft, Braunkohlelager, Granitfindling nördlich Klitzschmar, Schmelzwasserablagerungen und Grundmoränen der Saalekaltzeit, tertiäre Schichten
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	8 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	2 %
F1	Ackerkomplex	71 %
F3	Gehölzkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	4 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	2 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	3 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	1 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	9 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	0 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	0 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4439-452	4440-303	209	FFH	b	+	Sprödaer Wald und Triftholz	97,00	2

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Überflutung wertvoller Offenlandhabitate durch weiteren Wasseranstieg in den Tagebaurestseen, außerdem Verlust von Offenlandflächen durch eine fortschreitende natürliche Sukzession
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A02	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
K01.01	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:**Institute**

UNB Nordsachsen, UNB Nordsachsen

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Erh.- Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.- Qual.	Pop.- Größe	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Biog.- Bed.	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Anh.	Jahr
AVE	Alcedo atthis		X	n	G			D	1	h					VR	2007
AVE	Anas acuta			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012
AVE	Anas clypeata			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012
AVE	Anas penelope			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			w	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012

AVE	Anas platyrhynchos			m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas querquedula			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas querquedula			n	G	2 - 3		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Anas strepera			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser albifrons			w	M	5.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser albifrons			m	M	5.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser anser			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser brachyrhynchus			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser erythropus			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Anser fabalis			w	M	10.000		D	2	m	B			B	VR-Zug	2012
AVE	Anser fabalis			m	M	10.000		D	2	m	B			B	VR-Zug	2012
AVE	Anthus campestris			n	G	7 - 8		D	1	h	C			C	VR	2007
AVE	Ardea cinerea			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			w	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea purpurea			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	501 - 1.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya nyroca			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Botaurus stellaris			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Botaurus stellaris			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Branta ruficollis			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Bucephala clangula			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Calidris alpina			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Chlidonias niger			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia ciconia			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Circus aeruginosus			n	G	6		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Cygnus cygnus			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Cygnus olor			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	3		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Egretta alba			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR	2012

AVE	Emberiza hortulana			n	G	2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Falco subbuteo			m	M			D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Falco subbuteo			n	G	2		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Fulica atra			w	M	1.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Fulica atra			m	M	3.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Gavia arctica			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Gavia stellata			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Grus grus			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Haliaeetus albicilla			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Jynx torquilla			n	G	2		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Lanius collurio			n	G	35 - 45		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Lanius excubitor			n	G	6		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Larus argentatus			w	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus argentatus			m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus cachinnans			w	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus cachinnans			m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus canus			m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus melanocephalus			n	G	45		D	3	h	B			B	VR	2007
AVE	Larus michahellis			m	M	100		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus minutus			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Larus ridibundus			m	M	3.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus ridibundus			w	M	251 - 500		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Lullula arborea			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Luscinia svecica			n	G	0 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Melanitta fusca			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Melanitta nigra			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Mergus albellus			m	M	20		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Mergus merganser			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Miliaria calandra			n	G	60 - 70		D	1	h	A			A	VR-Zug	2007
AVE	Milvus migrans			n	G	10		D	1	h	A			A	VR	2007
AVE	Milvus milvus			n	G	13		D	1	h	A			A	VR	2007
AVE	Netta rufina			m	M	10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Netta rufina			n	kD			D	l						VR-Zug	2007
AVE	Oenanthe oenanthe			n	G	18		D	l	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Pernis apivorus			n	G	1		D	l	h	B			B	VR	2007
AVE	Phalacrocorax carbo			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Philomachus pugnax			m	M	51 - 100		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Pluvialis apricaria			m	M	501 - 1.000		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Podiceps auritus			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Podiceps cristatus			m	M	51 - 100		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Podiceps grisegena			n	G	11		D	l	h	C			C	VR-Zug	2007
AVE	Podiceps nigricollis			n	G	25		D	l	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Saxicola rubetra			n	kD			D	l	h					VR-Zug	2007
AVE	Sylvia nisoria			n	G	4 - 5		D	l	h	B			B	VR	2007
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tringa glareola			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Upupa epops			n	G	1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Vanellus vanellus			m	M	1.001 - 10.000		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Vanellus vanellus			n	G	12		D	l	h	C			C	VR-Zug	2007

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	GALECRIS	Galerida cristata					n	v	s	2007
AVE	PERDPERD	Perdix perdix					n	2	-	2007

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)

Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296872212066	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalsstauchers (<i>Podiceps nigricollis</i>) in Sachsen	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	445-478	
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_Isn_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfUG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872218520	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872218832	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872219145	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2005	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen -	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	

			Jahresbericht 2001				
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Hinweise zu Einflüssen und Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (Cygnus olor) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185-192	

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %