

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4645-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Gebietsnummer: | 4645-451 | Gebietstyp: | A |
| Landesinterne Nr.: | 27 | Biogeographische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen | | |
| Name: | Linkselbische Bachtäler | | |
| geographische Länge (Dezimalgrad): | 13,4333 | geographische Breite (Dezimalgrad): | 51,0742 |
| Fläche: | 3.032,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | | Als GGB bestätigt: | |
| Ausweisung als BEG: | | Meldung als BSG: | November 2006 |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | Januar 2007 |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | VO der RP Chemnitz, Dresden und Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Linkselbische Bachtäler' vom 30.11.2006 (SächsABl. Jg. 2006 Bl.-Nr. 51 S. 1158), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012 | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | blis | | |
| Erfassungsdatum: | Oktober 2006 | Aktualisierung: | Mai 2015 |
| meldende Institution: | Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|---------------|
| MTB | 4645 | Riesa |
| MTB | 4745 | Riesa-Pausitz |
| MTB | 4746 | Zehren |
| MTB | 4845 | Lommatzsch |
| MTB | 4846 | Meißen |
| MTB | 4847 | Coswig |
| MTB | 4946 | Mohorn |
| MTB | 4947 | Wilsdruff |
| MTB | 5046 | Freiberg |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|----------|
| DED1 | Chemnitz |
| DED2 | Dresden |
| DED2 | Dresden |

| | |
|------|---------|
| DED2 | Dresden |
| DED3 | Leipzig |

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|---|
| 424 | Unteres Osterzgebirge |
| 450 | Mittelsächsisches Lößlehnhügelland |
| 460 | Dresdener Elbtalgebiet |
| 462 | Großenhainer Pflege |
| 463 | Mittelsächsisches Lößgebiet |
| 464 | Oschatzer Hügelland |
| 881 | Elbe-Elster-Tiefland |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D19 | Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland |

Bewertung, Schutz:

| | |
|------------------------------|---|
| Kurzcharakteristik: | Bachtäler mit naturnahen Fließgewässern, Auwäldern, Grünland- und Ackerflächen, an den Elbhangbereichen naturnahe Wälder, Trockengebüsche, Obstwiesen, Trockenrasen sowie Felsbildungen |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten strukturreicher Bachauen mit naturnahen Fließgewässern sowie von Arten der Laubwälder |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Zeugnisse historischer Mühlen und mittelalterlicher Bergbauaktivitäten, Geologisch-bergbauhistorischer Lehrpfad (Geopfad) Triebischtal |
| geowissensch. Bedeutung: | Auenterrasse (Jahna), vielfältige, z.T. sehr alte Gesteine, Eisen-, Silber-, Kalkbergbau |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|-----|--|------|
| D | Binnengewässer | 1 % |
| E | Fels- und Rohbodenkomplexe | 0 % |
| F1 | Ackerkomplex | 4 % |
| F3 | Gehölzkulturkomplex | 4 % |
| G | Grünlandkomplexe trockener Standorte | 0 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 31 % |
| H04 | Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland') | 2 % |
| I2 | Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden | 0 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 46 % |
| L04 | Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten' | 0 % |
| N04 | Forstl. Nadelholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 2 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 5 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 1 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 1 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|---------|---------|
| | | FLandesint.- | | | | | Fläche- | Fläche- |
|--|--|--------------|--|--|--|--|---------|---------|

| Gebietsnummer | Nummer | Nr. | Typ | Status | Art | Name | Ha | % |
|---------------|----------|------|-----|--------|-----|---|----------|----|
| 4645-451 | 4545-452 | 26 | EGV | b | / | Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg | 6.793,00 | 0 |
| 4645-451 | 4846-301 | 171 | FFH | b | * | Triebischtäler | 1.177,00 | 35 |
| 4645-451 | 4746-302 | 86 E | FFH | b | * | Täler südöstlich Lommatzsch | 635,00 | 20 |
| 4645-451 | 4645-301 | 169 | FFH | b | + | Jahnaniederung | 403,00 | 13 |
| 4645-451 | 4846-302 | 168 | FFH | b | + | Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen | 896,00 | 30 |
| 4645-451 | 4545-301 | 34 E | FFH | b | / | Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg | 4.313,00 | 0 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|--|
| Die Angaben sind bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor |
|--|

Einflüsse und Nutzungen:

| Code | Auswirkung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| A01 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| B02.04 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |

Management:

Institute

| |
|--|
| UNB Dresden, UNB Dresden |
| UNB Meißen, UNB Meißen |
| UNB Mittelsachsen, UNB Mittelsachsen |
| UNB Nordsachsen, UNB Nordsachsen |
| UNB Sächs Schweiz-Osterzgebirge, UNB Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

| |
|--|
| |
|--|

| Maßnahme / Plan | Link |
|-----------------|------|
| | |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|------|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|-----------------------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| AVE | Alcedo atthis | | | n | G | 18 | | D | 1 | h | A | | | A | VR | 2008 |
| AVE | Anas crecca | | | m | M | 1 - 5 | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Anas platyrhynchos | | | w | kD | p | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Anas platyrhynchos | | | m | kD | p | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Ardea cinerea | | | m | M | 11 - 50 | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Ardea cinerea | | | w | M | 6 - 10 | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Aythya ferina | | | m | M | 1 - 5 | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Aythya fuligula | | | m | M | 1 - 5 | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Botaurus stellaris | | | m | M | 0 - 1 | | D | 1 | m | B | | | C | VR | 2012 |
| AVE | Ciconia ciconia | | | n | G | 3 | | D | 1 | h | B | | | B | VR | 2011 |
| AVE | Ciconia ciconia | | | m | M | 1 - 5 | | D | 1 | m | B | | | C | VR | 2012 |
| AVE | Ciconia nigra | | | m | M | 0 - 1 | | D | 1 | m | B | | | C | VR | 2012 |
| AVE | Ciconia nigra | | | n | G | 0 - 1 | | D | 1 | h | B | | | B | VR | 2011 |
| AVE | Crex crex | | | m | M | 0 - 1 | | D | 1 | m | B | | | C | VR | 2012 |
| AVE | Dendrocopos medius | | | n | M | 1 | | D | 1 | h | B | | | B | VR | 2014 |
| AVE | Dryocopus martius | | | n | G | 7 | | D | 1 | h | B | | | B | VR | 2008 |
| AVE | Falco subbuteo | | | n | G | 0 - 1 | | D | 1 | h | B | | | B | VR-Zug | 2008 |
| AVE | Fulica atra | | | m | kD | 5 | | D | 1 | m | B | | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Glaucidium passerinum | | X | n | kD | v | | D | 1 | h | | | | | VR | 2008 |
| AVE | Haliaeetus albicilla | | X | n | G | | | D | 1 | | | | | | VR | 2008 |
| | | | | | | | | | | | | | | | VR- | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|---|---|---------|--|---|---|---|---|--|---|--------|------|
| AVE | Jynx torquilla | | X | n | G | | | D | 1 | h | | | | Zug | 2008 |
| AVE | Lanius collurio | | | n | G | 70 - 90 | | D | 1 | h | B | | B | VR | 2008 |
| AVE | Mergus merganser | | | m | M | 6 - 10 | | D | 1 | m | B | | C | VR-Zug | 2012 |
| AVE | Miliaria calandra | | | n | G | 1 | | D | 1 | h | B | | B | VR-Zug | 2008 |
| AVE | Milvus migrans | | | n | G | 4 | | D | 1 | h | B | | B | VR | 2008 |
| AVE | Milvus milvus | | | n | G | 13 - 15 | | D | 1 | h | A | | A | VR | 2008 |
| AVE | Oenanthe oenanthe | | | n | G | 1 | | D | 1 | h | B | | B | VR-Zug | 2008 |
| AVE | Pernis apivorus | | | n | G | 1 - 2 | | D | 1 | h | B | | B | VR | 2008 |
| AVE | Picus canus | | | n | G | 1 - 2 | | D | 1 | h | B | | B | VR | 2008 |
| AVE | Saxicola rubetra | | | n | G | 1 | | D | 1 | h | B | | B | VR-Zug | 2008 |
| AVE | Sylvia nisoria | | | n | G | 1 - 2 | | D | 1 | h | C | | C | VR | 2008 |
| AVE | Tachybaptus ruficollis | | | m | M | 1 - 5 | | D | 1 | m | B | | C | VR-Zug | 2012 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |

Legende

| Grund | Status |
|--|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|-----|-------|------|-------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|--|---|-----|---------|-----------------------------------|
| SN63296956125453 | Bauer et al. | 2002 | Rote Liste der Brutvögel Deutschlands | Ber. Vogelschutz | 39 | 13-60 | |
| SN63296956127810 | Bauer, H.-G. und Berthold, P. | 1997 | Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand | | | | AULA-Verl. |
| SN63296956123189 | Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.) | 2005 | Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas | | | | AULA-Verl. |
| SN63296956125078 | Boschert, M. | 2005 | Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003. | Vogelwelt | 126 | 1-51 | |
| sn1047 | Breinl | 1998 | Vegetationskartierung des NSG 'Jahnauwälder' und angrenzender Erweiterungsflächen | | | | |
| SN63296872214988 | Bäßler, R. et al. | 2000 | Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG) | | | | |
| sn0523 | Büro für ökologische Gutachten und Planungen, Gera | 1995 | Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet 'Käbschützgrund bei Zöthain'. (Auftraggeber: StUFA Radebeul) | | | | |
| SN63296956127155 | Flade, M. | 1994 | Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten | | | | IHW-Verlag |
| SN63296956126796 | Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997) | 1973-1997 | Handbuch der Vögel Mitteleuropas | | | | |
| SN63296867587949 | Hempel, W. und Schiemenz, H. | 1986 | Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5 | | | | (Keine Vorschläge) |
| SN63296872210112 | Kneis, P. et al. | 2003 | Die Brutvögel der nordsächsischen Elbetalregion um Riesa | Mitt. Ver. Sächs. Ornithol., Sonderheft 1 | 9 | | |
| SN63296956123595 | Kowalke, H. (Hrsg.) | 2000 | Sachsen | | | 376 | Klett-Perthes Gotha und Stuttgart |
| _lsm_neul | Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) | 2015 | Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG | | | | |
| SN63296956123392 | LfUG | 2006 | Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA | | | | |
| SN63296956126140 | Mannsfeld, K. und Richter, H. | 1995 | Naturräume in Sachsen | | | | |
| SN63296872217879 | Nachtigall, W. und Ulbricht, J. | 2001 | Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (Milvus milvus) in Sachsen im Jahre 2000 | Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. | 8 | 611-617 | |
| SN63296872211410 | Rau, S. et al. | 2002 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 44 | 63-72 | |
| SN63296956124594 | Rau, S. et al. | 1999 | Rote Liste Wirbeltiere. | Materialien zu Naturschutz und Landespflege | | | LfUG (Hrsg.) |
| SN63296872210769 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2000 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 42 | 67-76 | |
| SN63296872211097 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2001 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 43 | 69-76 | |
| SN63296872211738 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2003 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 45 | 61-70 | |
| | | | Potentielle Natürliche Vegetation | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|------|---|--|----|---------|-----------------------|
| SN63296956125796 | Schmidt, P.A. et al. | 2002 | Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG) | | | | |
| SN63296956127498 | Steffens, R. et al. | 1998 | Die Vogelwelt Sachsens | | | | Gustav Fischer Verlag |
| SN63230253930221 | Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S. | 1998 | Atlas der Brutvögel Sachsens | Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege | | | LfUG (Hrsg.) |
| SN63296956124251 | Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie | 1992 | Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000. | | | | |
| SN63296956126452 | Südbeck, P. et al. | 2005 | Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands | | | | |
| SN63296872213347 | Ulbricht, J. und Nachtigall, W. | 2003 | Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (Cygnus olor) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002 | Actitis | 38 | 57-68 | |
| SN63296872218192 | Ulbricht, J. und Nachtigall, W. | 2003 | Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Sachsen im Jahr 2001 | Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. | 9 | 185-192 | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |