

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 5142-451

- Aktualisierung 2015

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	5142-451	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	75	<b>Biogeographische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen		
<b>Name:</b>	Limbacher Teiche		
<b>geographische Länge (Dezimalgrad):</b>	12,7508	<b>geographische Breite (Dezimalgrad):</b>	50,8439
<b>Fläche:</b>	245,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 2006
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2006
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Limbacher Teiche' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 197), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>	blis		
<b>Erfassungsdatum:</b>	Oktober 2006	<b>Aktualisierung:</b>	Mai 2015
<b>meldende Institution:</b>	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	5142	Hohenstein-Ernstthal
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DED2	Dresden
------	---------

**Naturräume:**

450	Mittelsächsisches Lößlehmhügelland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Teichgebiet im unteren Bergland, naturnahe und fischereiwirtschaftlich genutzte Teiche, besitzen teilweise eine ausgeprägte Wasser- und Verlandungsvegetation und sind weitgehend über naturnahe Bachläufe miteinander verbunden
<b>Teilgebiete/Land:</b>	

Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Vogelarten der weiträumigen Feldflur mit Äckern, extensiven Frisch-, Feucht- und Nasswiesen sowie Waldresten und Arten flacher, wasserpflanzenreicher Standgewässer mit dichter Verlandungsvegetation und Inseln
Kulturhistorische Bedeutung:	Fischereiwirtschaftlich genutzte Teiche
geowissensch. Bedeutung:	überwiegend Glimmerschiefer, Granulit, Löss, kleinflächig basische Magmatite (Gabbro, Serpentin)it
Bemerkung:	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	11 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	28 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	39 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	3 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	2 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	10 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	1 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	0 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	1 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5142-451	5142-301	245	FFH	b	*	Limbacher Teiche	196,00	60

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einseitig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

--

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

Störungen durch unangepasste Vergrümmungsmaßnahmen, im Übrigen sind die Angaben bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Einflüsse und Nutzungen:**

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A03	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A07	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A08	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F02.01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
F02.03	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
F03.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G05	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb

**Management:**

**Institute**

UNB Zwickau, UNB Zwickau
-----------------------------

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Alcedo atthis			n	G	2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Anas clypeata			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	M	251 - 500		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas querquedula			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas strepera			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Ardea cinerea			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Calidris alpina			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Chlidonias niger			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia ciconia			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2011
AVE	Ciconia ciconia			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Circus aeruginosus		X	n	G			D	1	h					VR	2007
AVE	Crex crex			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Cygnus olor			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Egretta alba			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Fulica atra			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Gallinago media			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Lanius collurio			n	G	8		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Larus canus			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus melanocephalus			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Larus minutus			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Larus ridibundus			m	M	501 - 1.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Milvus milvus		X	n	G			D	1	h					VR	2007
AVE	Phalacrocorax carbo			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Philomachus pugnax			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Podiceps cristatus			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Podiceps nigricollis			n	G	3		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Saxicola rubetra		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tringa glareola			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Vanellus vanellus			m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Vanellus vanellus		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2007

## weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
-------	------	------	---	----	---------	--------	--------	------------	-------	------

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

**Literatur:**

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG)				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296872212066	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalsstauers (Podiceps nigricollis) in Sachsen	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	445-478	
SN63296872207206	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Limbacher Teiche. Mündliche Mitteilung.				
							Klett-

SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans ( <i>Milvus milvus</i> ) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611- 617	
SN63296872218520	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872218832	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872219145	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2005	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans ( <i>Cygnus olor</i> ) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers ( <i>Podiceps cristatus</i> ) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185- 192	

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %